

CRP (Capcane in Reumatologia Pediatrica)

Alexis Cochino, Sigrid Covaci, Oana Farkas

Bolile reumatologice reprezinta un capitol important din patologia cronica pediatrica. Astfel, artrita idiopatica juvenila (AIJ) are o incidență de ordinul 10/100.000 de persoane pe an; impactul personal, familial și socioeconomic, însă, este mult mai mare. Deoarece în majoritatea cazurilor nu există un test unic cu rol de standard de aur, diagnosticul se bazează pe seturi de criterii clinice, paraclinice și de laborator. Își din acest motiv, un bun diagnostic pozitiv este asigurat doar de un diagnostic diferențial riguros. Astfel, se pot evita capcane de tipul: AIJ sistemic/mucocel maxilar odontogen, dermatomiozita/hepatita autoimună, AIJ/lupus eritematos sistemic (LES), spondilartrita juvenila/limfom Hodgkin, LES/obezitate+Cushing, AIJ sistemic/limfohistiocitoza hemofagocitica. O formă de AIJ, cea monoarticulară, furnizează probabil cele mai numeroase surpize diagnostice alternative: sarcom iliac, artrita vilonodulară, corp strain. În procesul diagnostic al bolilor autoimune, trebuie explorată fiecare posibilă explicație alternativă, deoarece tratamentul și prognosticul pot fi total diferite, atât în bine, cât și în rau.